

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

外用副腎皮質ホルモン剤 ハーバーSS軟膏

第②類医薬品

主成分として配合されているプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、抗炎症作用により、皮膚の炎症、はれ、かゆみを抑えます。皮膚表面の患部で優れた効果を示し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される特徴を持つ、アンテドラックといわれる新しいタイプのステロイド剤です。イソプロピルメチルフェノールは、殺菌作用により患部の化膿を防ぎます。また、かゆみ止め作用を有するクロタミトンがかゆみを鎮め、トコフェロール酢酸エステルにより、血行を促進し治療を助けます。のびのよい、皮膚なじみやすい基剤ですので、夏冬の気温差に関係なく、ソフトな使用感の軟膏です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい
3. 長期連用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

成分・分量

100g中

成分	分量
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g
イソプロピルメチルフェノール	0.10g
クロタミトン	5.00g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

添加物として、ゲル化炭化水素を含有します。

※効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (6)本剤を塗擦後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)