

手指のあれ、
ひじ・ひざ・かかとの
カサカサに。
ヒフナップ20CE
第3類医薬品 40g

第3類医薬品

手指のあれ、
ひじ・ひざ・
かかとの
カサカサに。

乾燥肌と
角化症の
治療薬

40g

スクワラン
入り基剤使用

セラミドS
配合

グリチルレチン酸0.3%
尿素20%配合クリーム
ヒフナップ20CE

チューブタイプ



製造
番号
使用
期限

販売名：ヒフナップ20CE

40g

第3類医薬品

ご使用に際して、このケースの説明書きを必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう、大切に保管して下さい。

【効能・効果】 手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗擦して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けて下さい。(3)小児(15歳未満)には使用させないで下さい。(4)本剤は外用にのみ使用して下さい。(5)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないで下さい。(6)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

【成分・分量】(100g中)
尿素…20.0g グリチルレチン酸…0.3g
添加物として、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、ステアリン酸ソルビタン、セタノール、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、パラベン、香料、その他4成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかとのカサカサに。

〔乾燥肌と角化症の治療薬〕

第3類医薬品 40g

セラミドS
配合

スクワラン
入り基剤使用

チューブタイプ

グリチルレチン酸0.3%
尿素20%配合クリーム
ヒフナップ20CE

押し
あける

△【使用上の注意】

⊗してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないで下さい(1)目の周囲、粘膜等。(2)引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。(3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。(4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。
■【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人。(2)薬や化粧品などにより刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態等

3.2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-468771

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 協和薬品工業株式会社
営業本部 岐阜県岐阜市野一色2丁目3番6号
製造販売元 新生薬品工業株式会社
富山県中新川郡上市町三丁目22番地

