

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第②類医薬品

新テシトン軟膏

新テシトン軟膏の主成分「ヒドロコルチゾン酪酸エステル」はすぐれた抗炎症作用があります。のびのよいゲル状の基剤で、ソフトな使用感の軟膏です。夏冬の気温差に関係なく、軟膏の硬さは一定し、快い使用感です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないで下さい
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい
3. 長期連用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

※効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布して下さい。なお、症状により適宜増減して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 本剤は外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

100 g 中

成 分	分 量
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.05 g

添加物として、ゲル化炭化水素を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

 **0120-468771**

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **協和薬品工業株式会社**
営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
富山県中新川郡上市町三日市22番地