

協和薬品工業株式会社  
 協和薬品工業株式会社  
 〒059-846-8771  
 東京都葛飾区新小岩5-1-1  
 本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買取りの店にお申し付け下さい。  
 詳しいお買取りの店をお探し下さい。  
 協和薬品工業株式会社  
 〒059-846-8771  
 東京都葛飾区新小岩5-1-1

【成分・分量】  
 (1) 成分  
 (2) 小瓶に使用させる  
 (3) 目  
 (4) 外用にのみ使用して下さい。

【用法・用量】  
 1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

【効能・効果】  
 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【保存及び取扱上の注意】  
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。  
 (2) 小瓶の蓋がはまらない所に保管して下さい。  
 (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になつたり、品質が変わります。)  
 (4) 使用期限(ターム)に記載された使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【皮膚(患部)】  
 発疹、発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ピリピリ感、みずむし、たむし等の日傷、にきび、化膿性、持続的な刺激感

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【相殺すること】  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (4) 患部が広範囲の人。  
 (5) 腫瘍やたれのひどい人。  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなり、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

セルブメタメケーション  
 税控除対象

皮膚患部でよく効き  
 体内では低活性

がまんできない  
 湿疹、かゆみ  
 皮膚炎に

じんま疹  
 あせも  
 虫さされ  
 かぶれ

3つの作用で  
 がまんできない症状を抑えます。

消炎作用  
 かゆみ止め作用  
 殺菌作用

第②類医薬品

ベタつかないさらっとしたクリームタイプ

デシトンプエクトプラス

抗炎症成分  
 PVA  
 配合

皮膚疾患治療薬 8つの成分がすばやく効く クリームタイプ 20g

使用期限  
 製造番号

4 962307 091241