テシトンフェクトプラス
第②類医薬品

テシトンフェクトプラス
第②類医薬品

ご使用に際し、この外箱の記載内容を必ずご読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

販売名 テシトンフェクトプラス軟膏　第②類医薬品

〈皮膚疾患治療薬〉

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘（水ぼうそう）、かぶれ・ただし化膿している患部。
(2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などにより（アレルギー）症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ただれ、かぶれ、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	かすかないたい等の白斑、にきび（化膿症状）持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目にこられないように注意してください。万一、目にこった場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中) プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (PVA) 1.5mg、クリオキノール 5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、クロタミトン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、アラントイン 2mg、イプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、マクロゴール、ステアリン酸ポリオキシル40、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポビドン、エデト酸ナトリウム水和物を含有します。

保管及び取扱いの注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります）。(4) 使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

問合先 0120-149-931
（本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの お店又は下記までご連絡ください。）
消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社　お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00～12:00,13:00～17:00（土、祝日を除く）

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

がまんできない
湿疹、かゆみ
皮膚炎に
じんま疹
虫さされ
あせも
かぶれ
皮膚患部で
よく効き
体内では低活性
セルフメディケーション
税控除対象

湿疹
かゆみ
虫さされ
●皮膚炎 ●あせも ●かぶれ ●じんま疹

消炎作用
かゆみ止め作用
殺菌作用
3つの作用で
がまんできない症状を抑えます。

チューブの開け方
キャップを裏返して押しこむ

A3002

しっとりと密着する軟膏タイプ

第②類医薬品

テシトンフェクトプラス

抗炎症成分 PVA 配合

皮膚疾患治療薬　8つの成分がすばやく効く　軟膏タイプ　20g

使用期限
製造番号

1

M002