

第3類医薬品
ウイソバル
ひび・あかぎれ
クリーム

第3類医薬品
ウイソバル
ひび・あかぎれ
クリーム

用法・用量 1日2回、適量を患部に塗布してください。

効能・効果 ひび・あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量に関する注意 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

相対すること 1. 次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 薬が処方されている人、またはアレルギー反応を起こしている人。
(2) 患部がただれている人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

△使用上の注意 (1) ひび・あかぎれ治療薬

第3類医薬品 販売名 ウイソバルひび・あかぎれクリーム

ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要に応じて詳しくお読みください。

第3類医薬品 24g

24g

保存及び取扱上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管してください。(2) 小児の手が届かない所に保管してください。(3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(4) 他の容器に入替えたりしないでください。(5) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。

成分・分量 (100g中) ビタミンD 0.5g、ビタミンE 50000国際単位、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、ステアリン酸モノオレイル 0.3g、イソステアリン酸モノオレイル 0.1g、シロキサン 0.5g、シリコニウムオイル 40.0g、添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシドリン、ポリオキシエチレンソルビレート、モノステアリン酸グリセリン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸グリセリン、ポリエチレングリコール、グリセリン、水、香料、フェニルアルコールを含有します。

相対すること 1. 次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 薬が処方されている人、またはアレルギー反応を起こしている人。
(2) 患部がただれている人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

協和薬品工業株式会社
製造販売元
東京都中央区新富1-1-1 協和薬品工業株式会社
〒104-8771
058-246-8771
〒104-8771
058-246-8771
協和薬品工業株式会社
〒104-8771
058-246-8771

第3類医薬品 24g

24g

修復 & 新陳代謝促進成分
W 処方
アラントイン
ビタミンA油

手・指・かかとの
ひび・あかぎれ・しもやけ
ゴチゴチな
ひび・あかぎれ・かかとのひび割れにも!

手・指・かかとの
ひび・あかぎれ・しもやけ

イメージ図
保湿
修復
抗炎症

修復 & 新陳代謝促進成分 **W 処方**

**ウイソバル
ひび・あかぎれ
クリーム**

くり返す
ひび割れにも!

24g 第3類医薬品

(べたつかないで手になじむ なめらかな塗り心地)

使用期限

製造番号



M002

紙箱