

せき、たん ノスポール 鎮咳顆粒

発作的におこる激しいせきや、のどにからまるたんは、とても苦しくつらいもの。周囲の人に不快感を与える結果にもなります。ノスポール鎮咳顆粒は、せきをしずめる成分、たんをとり去る成分を効果的に配合した服用しやすい顆粒剤です。

⚠ 使用上のご注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人には服用しないで下さい。
(1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがある)
4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 過量服用・長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。






便秘、口のかかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

年齢区分	15才以上	11～14才	8～10才	5～7才	3～4才
1回量					
	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

上記1回量を、1日3回食後に服用して下さい。

服用間隔は、4時間以上おいて下さい。

- お子さまに服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法・用量をお守り下さい。
- 3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1g

成分	分量	作用
リンゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	卵白より抽出した消炎酵素物質で、炎症を抑え、痰の咯出を容易にします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	中枢神経に作用してせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げる作用があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	アレルギーによるせきに効果があります。


添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、バレイシヨデンプン、サッカリンNa水和物、香料を含有します。

保管・取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

 **0120-468771**

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 株式会社 **廣昌堂**
富山県射水市水戸2841