

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬
たん、たんのからむせきに

第2類医薬品

スルーロン去たん錠

L-カルボシステイン・ブロムヘキシン塩酸塩配合

のどにからむたんは不快でいやなものです。また、せきをするのでからんだたんを体外へ出そうとします。スルーロン去たん錠は、そんな不快でいやなたんに効果のある医薬品です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、腹痛 |
| 精神神経系 | 頭痛 |
| その他 | 血たん |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢、口のかわき

4. 3～4日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

たん、たんのからむ咳

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回食後に服用してください。

| 年 齢 | 大人 (15歳以上) | 8歳以上15歳未満 | 8歳未満 |
|-----|------------|-----------|---------|
| 1回量 | 2錠 | 1錠 | 服用しないこと |
| | ○ ○ | ○ | × |

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

(PTPシートの取り出し図)



〈成分・分量〉

1日量 (6錠) 中

| 成 分 | 分量 | はたらき |
|------------|-------|---|
| L-カルボシステイン | 750mg | のどにからむ粘稠なたんをうすめるとともに、荒れた気道粘膜を正常化し、たんの排出をうながします。 |
| プロムヘキシン塩酸塩 | 12mg | 気道分泌を高め、のどにからんだたんをうすめて出しやすくします。 |

添加物として、セルロース、乳糖、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468-771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号