

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンC主薬製剤 ビタアルトC錠2000

第3類医薬品

ビタミンC(アスコルビン酸)は、生理的に重要な働きをするビタミンの1つで、新鮮な野菜、果物、緑茶などに多く含まれ、人の体内ではつくることができないため、食品や医薬品から摂取することが必要です。ビタアルトC錠2000は、6錠中に2000mgのビタミンCを含有した医薬品です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

次の諸症状の緩和:

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防:

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

次の場合のビタミンCの補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を朝夕食後に水またはお湯で、かまずに服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	2回
11歳以上15歳未満	1~2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

1日量(6錠)中

成分	分量
ビタミンCとして	2000mg
{アスコルビン酸(ビタミンC)}	1400mg
{アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCのカルシウム塩)}	726mg
ニコチン酸アミド	36mg
酪酸リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

(1) 本剤の服用により、尿が黄色くなるがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので心配ありません。

(2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えます。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないで下さい。

(変色等の原因となり、品質が変わることがあります。)

(5) びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いて下さい。

(6) びんの中の「紙包み」は乾燥剤です。取り出したり、開けたり、食べたりしないで下さい。

(7) 箱の内蓋及びラベルの「開封年月日」欄に、開封日を記入して下さい。

(8) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **協和薬品工業株式会社**
営業本部:岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**
富山県富山市水橋町555番地